



发布日期: _____

结肠镜检查准备说明
2天Mira lax+Dulcolax (非处方药)

感谢您选择St. Joseph Hospital !

日期: _____ 到院时间: _____ 医生: _____

**内镜科可能会在手术当天与您联系, 以调整您的到院时间。*

位置: 172 Kinsley Street, Nashua, NH – Main Lobby, 2nd Floor Endoscopy Department

手术前一周需要预约挂号。想预约挂号, 或者如果您对保险费用有任何疑问, 请致电 **866-620-4781**。

如果您对手术准备或手术有任何疑问, 或者出于任何原因您需要重新安排手术, , 请致电**603-578-9363**。

提前计划

- 尽快打电话直接咨询您的保险公司, 以确定您的手术是否在理赔范围内。
- 如果您过去做过结肠镜检查, 但手术准备不充分, 请尽快致电我们的办公室, 因为手术准备可能已发生变化。
- 如果您出现发烧、咳嗽或任何类似感冒/流感的症状: 或有任何心脏或呼吸检查未做完, 则必须打电话给我们重新安排时间。
- 由于手术过程中会实施麻醉, 因此需要有一名可靠的成年人或达到法定驾驶年龄的人在手术后开车送您回家。**您不能开车或走路**。您手术后第二天完全可能恢复正常活动。如果无人开车送您回家, 我们将不得不取消您的手术。



ST. JOSEPH HOSPITAL

保险信息

我们强烈建议您在接受任何手术之前，直接致电您的保险公司核实您的福利承保范围，从而了解您的福利详情。

- 可以通过拨打866-620-4781了解手术的预估费用。
- 结肠镜检查的标准CPT代码是**45378**，筛查和诊断性结肠镜检查均适用。
- 如果在筛查过程中需要进行活检或切除息肉，您的保险福利可能会发生变化。
- 您的福利承保范围也可能因手术地点而异。如果您的保险公司在名录中找不到St. Joseph Hospital Nashua，我们的税号是：02-0222215。
- 如果您除了结肠镜检查之外还进行了上消化道内窥镜检查(EGD)，请向您的保险公司核实承保范围。上消化道内窥镜检查(EGD)的CPT代码为**43235**。

麻醉费用——SJH的麻醉服务由Narragansett Bay Anesthesiology提供：401-632-4464。

- 某些保险可能对麻醉的承保范围有所限制。我们建议您查看您的个人福利。

药物

- 如果您仅出于**减肥目的**每日服用下列任何一种药物，请在手术前 24 小时内暂停服药。如果您仅出于**减肥目的**每周服用下列任何一种药物，请在手术前 1 周内暂停服药。
 - Dulaglutide (Trulicity)、Exenatide 缓释(Bydureon bcise)、Exenatide (Byetta)、Semaglutide (Ozempic)、Liraglutide (Victoza、Saxenda)、Lixisenatide (Adlyxin)、Semaglutide (Rybelsus)

如果属于以下情况，请致电您的主治医师或处方医师：

- 您服用血液稀释剂，如 Coumadin (Warfarin)、Apixaban (Eliquis)、Plavix (Clopidogrel)、Aggrenox、Ticlid (Ticlopidine)、Pradaxa (Dabigatran)、Effient (Prasugrel)、Brilinta (Ticagrelor)或 Xarelto，想了解停止服药的说明。
- 您患有糖尿病，想讨论您的糖尿病药物。
- 您正在接受 Lovenox 注射。上述必须在手术前 24 小时停药。
- 有关所有其他药物的问题，请咨询您的主治医师或处方医师。

GI 无法就调整用药给予建议。如果您对您的处方药有任何疑问，请致电您的主治医师或处方医师。



要购买的手术准备物品

- **Miralax** : (2)瓶8.3盎司 (238克) 装和(1)瓶4.1盎司 (119克) 装Polyethylene Glycol 3350 (Miralax或学名药)。
- **Dulcolax (刺激性泻剂)** : (4) 5 毫克 Dulcolax 片剂
- 婴儿湿巾/护肤品 (如果需要)
- **Gatorade/运动饮料/批准的透明液体** : (2)瓶64盎司装和(1)瓶32盎司装。任何口味都可以, 除了红色、橙色或紫色。

结肠镜检查前7天

- 如果可能的话, 提前购买手术准备物品。
- 停用口服铁补充剂 (非输液)、含铁复合维生素、鱼油、维生素E。
- **开始低纤维饮食。**避免任何含有种子、果皮、坚果、沙拉和生蔬菜的食物。

允许	避免
肉类 (牛肉、猪肉、不带皮的家禽) 和鱼肉	全麦或全谷物面包、谷类或意大利面
不含种子或坚果的白面包	糙米或野生稻、燕麦、荞麦粥、大麦、藜麦
白米饭、白色意大利面、饼干	干果和西梅汁
煎饼和华夫饼	有种子、果皮或膜的水果 (葡萄、橙子、浆果)
煮熟并去皮的胡萝卜、土豆、无籽南瓜、去皮蔬菜面条	生的或未煮熟的蔬菜和沙拉 (玉米、生菜、球芽甘蓝、菠菜)
无皮、籽或膜的水果 (甜瓜、香蕉、去皮苹果、去皮水果罐头)	豆类、豌豆和扁豆
牛奶和由牛奶制成的食品, 乳替代品	种子和坚果, 以及含有它们的食物 (花生酱和其他坚果酱)
黄油、人造黄油、油和无籽沙拉酱	爆米花



ST. JOSEPH HOSPITAL

结肠镜检查前2天

- **早上**——

不吃固体食物，避免全流质饮食，不吃乳制品，不喝酒。只采取清流质饮食。

允许	避免
水	避免牛奶，乳制品或乳制品替代品
黑咖啡/茶（不加牛奶、奶精）	避免红色、橙色或紫色液体
避免红色、橙色或紫色的透明果汁	避免葡萄、水果饮料，或蔓越莓汁
清汤	避免带果肉的果汁（例如橙汁）
冰棍	避免奶昔
果冻	避免坚果牛奶
椰子水	

- **从下午5:00开始**——将238克瓶装Polyethylene Glycol 3350 (Miralax)粉末混合到一个64盎司的Gatorade/Powerade容器中，在2½小时内慢慢饮用。排便可能会延迟。可能需要时间才能有便意。四处走动会有帮助。

结肠镜检查前一天

即使您可能不得不在半夜醒来，也一定要按照以下时间表指示行事。如果您过早完成手术准备，消化系统产生的液体会积聚，这会影响您的手术质量。

- **早晨**——
服用(4)片5毫克Dulcolax片剂。请继续保持只采取清流质饮食。杜绝固体食物/全流质饮食。
- **从下午5:00开始**——将238克（8.3盎司）瓶装MIRALAX (Polyethylene Glycol 3350)粉末混合到一个64盎司的Gatorade/Powerade/透明液体容器中，在2½小时内慢慢饮用。排便可能会延迟。可能需要时间才能有便意。四处走动会有帮助。



结肠镜检查当天早晨

请继续保持只采取清流质饮食。杜绝固体食物/全流质饮食。

到院前5小时:

- 将119克（4.1盎司）瓶装MIRALAX (Polyethylene Glycol 3350)粉末混合到一个32盎司Gatorade/Powerade/透明液体容器中，并在1小时内慢慢饮用。
- 仅可饮用透明液体*（参见透明液体列表）。
- 可以刷牙。
- 到院时，大粪应呈透明/黄色，任何多余的液体将在手术过程中被吸出。

到院前4小时: 绝对不要进食任何东西——

杜绝嚼口香糖；糖果；薄荷糖；抽烟，喝水。嘴唇干燥可以使用唇膏。

您当天早上在就诊前三(3)小时仅可以服用以下药物：

- 心脏
- 癫痫
- 血压
- 哮喘药物和吸入器



ST. JOSEPH HOSPITAL

页码5

结肠镜检查当日流程

我们要求您携带以下物品：完整的内窥镜检查健康史表（资料包的最后一页），送您回家的驾车人姓名和电话号码，吸入器，CPAP/BiPAP（如果易于运输），眼镜（不要戴隐形眼镜），如果在月经期间可以使用卫生棉条，阅读资料或其他物品以防不可预见的延误，一份**您的药物清单副本**，列明剂量和上次服用时间（包括非处方药）。

请不要携带：任何贵重物品，包括珠宝。**如果您佩戴假牙，请不要在手术当天使用假牙粘附剂，因为可能需要取出假牙。**

在手术开始前，您将有机会与您的胃肠病医师和麻醉师讨论关于手术镇静事宜。他们将分别解释手术的性质，及其风险、好处和替代方案。您将需要签署一份同意书，表示您理解并同意该治疗。

预计您将在医院停留大约2½到3个小时。我们会尽一切努力按时进行，但可能会出现延误。

术后当天**您需要休息**。不要操作任何机器或驾驶机动车辆。

您将在手术后大约2到3周收到一封信件，向**您说明手术的结果**。



ST.JOSEPH HOSPITAL内窥镜检查

您的姓名：_____

药物或食物过敏： 否 是请列出_____

个人病史：请勾选所有适用项，并在下面列出任何其他医疗信息

- | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 高血压 | <input type="checkbox"/> 睡眠呼吸暂停 | <input type="checkbox"/> 癫痫 | <input type="checkbox"/> 肝病 |
| <input type="checkbox"/> 高胆固醇 | <input type="checkbox"/> CPAP_____ | <input type="checkbox"/> 背痛/受伤 | <input type="checkbox"/> 肾病 |
| <input type="checkbox"/> 贫血 | <input type="checkbox"/> BIPAP_____ | <input type="checkbox"/> 癌症，类型_____ | <input type="checkbox"/> 出血问题 |
| <input type="checkbox"/> 心脏病发作 | <input type="checkbox"/> 夜间打鼾 | <input type="checkbox"/> 糖尿病 | <input type="checkbox"/> 在过去一年曾摔倒 |
| <input type="checkbox"/> 心脏问题* | <input type="checkbox"/> COPD | <input type="checkbox"/> 甲状腺功能减退 | <input type="checkbox"/> 假牙 上部/下部/ |
| 如果是，请说明：_____ | <input type="checkbox"/> 哮喘 | <input type="checkbox"/> 甲状腺功能亢进 | |
| | <input type="checkbox"/> GERD/胃灼热 | | 部分（请圈出） |
| | <input type="checkbox"/> 中风 <input type="checkbox"/> TIA | | |

手术：

- | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 阑尾切除术 | <input type="checkbox"/> 胆囊 | <input type="checkbox"/> 子宫切除术 | <input type="checkbox"/> 剖腹产手术 | <input type="checkbox"/> 疝气 |
| <input type="checkbox"/> 扁桃体切除术 | <input type="checkbox"/> 心脏 | <input type="checkbox"/> 腹部外科 | <input type="checkbox"/> 眼科手术 | <input type="checkbox"/> 其他： |
| <input type="checkbox"/> 起搏器/除颤器 | <input type="checkbox"/> 关节置换，位置_____ | | | <input type="checkbox"/> 其他： |

您最后一次饮用液体是什么时候，包括您的手术准备：_____

您身体里是否含有金属（牙齿除外）？ 否 是 如果是，在哪里？_____

女性 - 末次月经期：_____您是否有可能已怀孕？ 否 是

社区健康问题 - （与您的手术无关！）-

您是否已填写生前遗嘱或医疗保健委托书？这是一份正式文件，指定某人在您无法做决定时为您做决定

是 否 如果否，您是否想进一步了解？ 是 否

如果您有药物清单，请交给护士**不要填写下面的内容**

请包括非处方药和草药。



ST. JOSEPH HOSPITAL

药物	剂量	多久一次	最后一剂	药物	剂量	多久一次	最后一剂

今天送您回家的人员姓名？

电话号码 _____

您今天带了哪些物品来做手术？如果您带入了以下物品，我们希望确保您离开时记得带走！

请把贵重物品留在家里。 圈出所有适用项

假牙：全口 部分 上部 下部

眼镜

助听器

拐杖

助行器

个人轮椅 其他： _____