

**Instrucciones de preparación del paciente para la endoscopia con cápsula
CapsoCam Plus®**

Cita de toma por la mañana

*NOTA: Si toma un suplemento a base de hierro por vía oral, suspéndalo 4 días completos antes de la prueba.

El procedimiento de endoscopia con cápsula está programado a las:

Dirección: 168 Kinsley Street 1st Floor Suite 10, Nashua NH 03060

Día _____ Fecha _____ Hora _____

El día antes del procedimiento

- Día: Coma normalmente durante el desayuno, seguido de un almuerzo liviano. Luego, empiece con una dieta de líquidos claros el resto del día/noche antes del procedimiento. (No tome nada de color rojo).
- Día: Mezcle siete (7) tapas (119 gramos) de Polyethylene Glycol (de las marcas
Hora: 7:00 p. m. MiralAX®, ClearLax, PureLax, GaviLax, LavaClear) con 32 oz. de agua o Gatorade® o Gatorade sin azúcar (que no sea rojo) y tome todo el contenido.
- Día: A las 9:30 p. m., tome 0.6 ml de gotas de Mylicon® con 8 oz de agua.
Hora: 9:30 p. m. Esto reducirá las burbujas en el tracto gastrointestinal.
No tome nada después de las 10:00 p. m. Se permiten pequeños sorbos de agua con el medicamento.

El día del procedimiento

- Día: Suspense los medicamentos hasta 2 horas después de tomar la cápsula, a
Hora: Mañana menos que el médico considere que es necesario tomarlos, luego tome pequeños sorbos de agua con los medicamentos.
- Día: Dos (2) horas antes de la hora programada para la toma de la cápsula, mezcle
Hora: 1 tapa (17 gramos) de Polyethylene Glycol (Miralax, Clearlax, etc.) con un vaso lleno de agua o Gatorade (que no sea rojo). La tapa del frasco de Polyethylene Glycol es una tapa medidora marcada para que tenga 17 gramos de polvo cuando la llena hasta la línea indicada.
- Día: Llegue al consultorio/clínica.
Hora:
Hora: **Tome la cápsula CapsoCam Plus** con 0.6 ml de gotas de Mylicon en 8 oz de agua.
- Hora: Reanude los líquidos claros 2 horas después de tragar la cápsula.
Hora: Cuatro (4) horas después de tomar la cápsula, mezcle 17 gramos de Polyethylene Glycol (Miralax, Clearlax, etc.) con un vaso lleno de agua o Gatorade (que no sea rojo); tome todo el contenido.
- Hora: Disfrute de un almuerzo liviano cuando esté listo. Documente lo que coma en el almuerzo.

Coma normalmente durante la cena. No es necesaria ninguna otra restricción en la dieta.