

通畅性检查胶囊用药说明

您需要在胶囊内镜检查/药丸照相机检查之前先吞服一粒通畅性检查胶囊。这样做的目的是确保您在进行胶囊内镜检查/药丸照相机检查时，真正的胶囊不会留在小肠内。如果通畅性检查胶囊留在小肠内，您可能会出现腹痛和恶心。通畅性检查胶囊会在一定时间后自行溶解，但如果胶囊留在小肠内，则无法进行胶囊内镜检查/药丸照相机检查，并且需要安排其他替代检查。

胶囊内镜检查前的研究当天：

1. 上午 8 点含水吞服通畅性检查胶囊
2. 食用清淡早餐
3. 下午 2 点食用清淡午餐
4. 此后直到次日 0 点，只能食用清流质

次日：

1. 在吞服通畅性检查胶囊至少 30 小时后完成/进行腹部 X 光检查。
 - a. 下午 2 点进行 X 光检查，以确认通畅性检查胶囊是否已排出体外。
2. 如果通畅性检查胶囊已排出，则可以预约胶囊内镜检查。

您的胶囊内镜检查前研究的确认信息

日期： _____

到达时间： 上午 8 点之前

地点： 168 Kinsley Street 一楼 10 号房

接诊人员： 护士

如有疑问，请拨打： 603-578-9363