

INSTRUCCIONES PARA LAS CÁPSULAS DE PERMEABILIDAD

Se le ha pedido que trague una cápsula de permeabilidad antes de la endoscopia con cápsula/cámara en forma de píldora. El motivo de esto es para asegurarse de que la cápsula real no se retenga en el intestino delgado cuando le hagan la endoscopia con cápsula/cámara en forma de píldora. Si ocurre una retención de la cápsula de permeabilidad, podría sentir dolor abdominal y náusea. La cápsula de permeabilidad se disolverá después de cierto tiempo. Sin embargo, esto también querrá decir que no se puede hacer la endoscopia con cápsula/cámara en forma de píldora, y será necesario coordinar una prueba alternativa.

Día del estudio:

1. Trague la cápsula de permeabilidad con un poco de agua a las 8:00 a. m.
2. Coma un desayuno liviano.
3. Coma un almuerzo liviano a las 2:00 p. m.
4. Tome líquidos claros hasta las 12:00 a. m. del día siguiente.

El día después:

1. Se debe realizar una radiografía abdominal al menos 30 horas después de haber tragado la cápsula de permeabilidad.
 - a. Una radiografía a las 2:00 p. m. para ver si pasó la cápsula de permeabilidad.
2. Si pasó la cápsula de permeabilidad, entonces puede proceder a programar la endoscopia con cápsula.

Confirmación del estudio con cápsula

Fecha: _____

Hora de llegada: a más tardar a las 8:00 a. m.

168 Kinsley Street 1st floor suite 10

Quién lo atenderá: enfermero

Llame si tiene alguna pregunta: 603-578-9363