

INSTRUÇÕES DE PREPARAÇÃO PARA ENDOSCOPIA POR CÁPSULA DE VÍDEO

Sua consulta está agendada para: _____ com um horário de chegada às 08h.

Não se atrase.

Local: 168 Kinsley Street, Medical Arts West Building, 1st floor Suite 10, Nashua, NH

Se tiver alguma dúvida sobre sua preparação ou consulta, **ligue para 603-578-9363**.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

- Ferro oral - não tome por 7 dias antes do procedimento.
- Carafato/sucralfato - não tome por 5 dias antes do procedimento.
- Anticolinérgicos (ex.: Benzil, Levsil, Amitriptilina, Zantac, Librax) - não tome por 5 dias antes do procedimento.
- Antiácidos (ex.: Maalox, Pepto-Bismol) - não tome por 5 dias antes do procedimento.
- Bloqueadores de canal de cálcio (ou seja, Norvasc/Amlodipina, Cardizem (Diltiazem), Procaria (Nifedipina), Verapamil) - não tome no dia do procedimento se for clinicamente aceitável.

COMPRAR:

- 1 frasco, 4,1 oz. (119 gramas) de Miralax (Polietilenoglicol 3350)
- 1 garrafa de 32 oz (950 ml) de líquido claro (EXCETO LÍQUIDOS DE COR VERMELHA)

DIA ANTES DE SUA ENDOSCOPIA POR CÁPSULA:

1. Você pode comer normalmente no seu café da manhã e almoço
2. **Após o almoço, você iniciará uma dieta de líquidos claros (SEM ALIMENTOS SÓLIDOS OU LÍQUIDOS INTEIROS)**
 - Os líquidos claros permitidos são: suco de fruta coado sem polpa, água, caldo de carne claro, chá/café sem leite ou creme, refrigerantes com gás, Gatorade, kool-aid, tang, gelatina ou outras bebidas com sabor de frutas (SEM SABORES QUE SEJAM DA COR VERMELHA), picolés, mel, açúcar e balas duras transparentes
3. **17h** - Misture o frasco inteiro de Miralax (Polietilenoglicol 3350) em um recipiente de 32 oz. (950 ml) de líquido claro PERMITIDO e refrigerado e agite bem. Beba lentamente durante 1-1 ½ horas.
4. Não fume 24 horas antes do procedimento e no dia do procedimento
5. Nada por via oral após a meia-noite

NO DIA DE SUA ENDOSCOPIA POR CÁPSULA:

- Não tome nada por via oral.
- Não tome nenhum medicamento a partir de 2 horas antes da realização da endoscopia por cápsula SB.
- Chegue ao consultório com duas peças de roupas folgadas.
- Será feito o check-in e solicitado que você assine seu termo de consentimento livre e esclarecido.

- Use uma peça de roupa na parte de cima feita de fibra natural fina, como uma camiseta, que seja longa o suficiente para chegar pelo menos até a altura do quadril e que não fique acima da cintura.
- Depois que o equipamento for aplicado, você será instruído a engolir a cápsula PILLCam SB.

DEPOIS DE INGERIR A CÁPSULA PILL CAM SB:

- Depois de ingerir a cápsula, NÃO coma ou beba por pelo menos 2 horas.
- NÃO DEITE-SE
- Depois de 4 horas, você pode comer sopa e biscoitos. Tome uma sopa saudável à base de caldo. Não tome sopas ou ensopados à base de creme. Continue mantendo a hidratação.
- Entre em contato com o consultório imediatamente caso sinta dor abdominal, náusea ou vômito durante a endoscopia por cápsula SB.
- Até que a pílula seja excretada, você não deve ficar perto de nenhuma fonte de campos eletromagnéticos potentes, como um aparelho de ressonância magnética ou um rádio amador.
- Esse exame dura aproximadamente 8 horas. Não desconecte o equipamento nem remova a correia em nenhum momento durante esse período. Evite movimentos bruscos ou qualquer batida no registrador de dados.
- Você precisará verificar algumas vezes por hora se a pequena luz na parte superior do registrador de dados está piscando em azul duas vezes por segundo. Se a luz parar de piscar, você deverá entrar em contato com o consultório médico.
- Evite qualquer atividade física extenuante, especialmente se envolver suor, e não se curve ou se abaixe durante a endoscopia por cápsula.

ENDOSCOPIA POR CÁPSULA: RISCOS E POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES

Seu médico determinou que, como parte de sua avaliação médica, você deve realizar um exame conhecido como endoscopia por cápsula SB. Esse procedimento envolve a ingestão de uma cápsula pequena (do tamanho de uma vitamina grande) PILLCam SB, que passará naturalmente pelo seu sistema digestivo enquanto tira fotos do seu intestino. As imagens são transmitidas via Bluetooth para um gravador de dados parecido com um Walkman, que salva as imagens. Você usará um gravador e um cinto na cintura. Depois de 8 horas, você voltará ao consultório para que o cinto de registro seja removido para processamento. A cápsula PILLCam SB é descartável e será excretada naturalmente em seu movimento intestinal. No caso raro de não ser excretada naturalmente, ela precisará ser removida por via endoscópica ou cirúrgica.

Ocasionalmente, algumas imagens podem ser perdidas devido a interferências. Em raras ocasiões, isso pode resultar na necessidade de repetir o estudo. Portanto, é importante manter-se afastado de campos eletromagnéticos.

Se não tiver verificado positivamente a excreção da cápsula PillCam SB do seu corpo e sentir náusea, dor abdominal ou vômito inexplicáveis após o procedimento, entre em contato com seu médico para avaliação e uma possível radiografia abdominal.

A realização de uma ressonância magnética enquanto a cápsula estiver dentro do corpo pode resultar em danos graves ao trato intestinal ou à cavidade abdominal. Se não tiver verificado positivamente a excreção da cápsula PILLCam SB do seu corpo, você deve entrar em contato com seu médico para avaliação e possível exame de raio X abdominal antes de se submeter a um exame de ressonância magnética.

ENDOSCOPIA POR CÁPSULA: CONSENTIMENTO

Entendo e aceito os riscos e as possíveis complicações, incluindo, entre outros, retenção de cápsulas, obstrução intestinal, aspiração/coagulação, interferência com dispositivos implantados, como marca-passos, exames incompletos ou lesões não detectadas. Também me explicaram os benefícios e os possíveis métodos alternativos de tratamento. Nenhuma garantia foi dada por ninguém com relação aos resultados que podem ser obtidos. Entendo que sou responsável pela devolução segura do cinto do Registrador de Dados no tempo alocado apropriado para a conclusão do exame. Tive a oportunidade de fazer perguntas, e elas foram respondidas de forma satisfatória.